

InfoPARK 2015

inizio ore 17.00

Aula della Casa delle Associazioni
via Duca D'Aosta 111 – Gorizia
info: 0481-33083 lafarfalla.go@libero.it

23 febbraio 2015

La depressione

La depressione è molto frequente nella malattia di Parkinson, circa il 40% dei parkinsoniani presenta almeno un episodio depressivo. Si manifesta come tristezza, rimorso, senso di colpa. Spesso nei pazienti con malattia di Parkinson la depressione può essere sottostimata in quanto il medesimo aspetto fisico di questi pazienti può mimare la depressione. A peggiorare la situazione c'è da considerare che la perdita del lavoro, il pensionamento anticipato, la crisi della mezza età, possono essere a loro volta causa di reazioni depressive.

Dottor Adriano Segatori - Psichiatra presso il Dipartimento di Salute Mentale AAS 2

20 aprile

Anestesia e Parkinson: per non aver paura.

Il malato parkinsoniano che deve sottoporsi ad un intervento chirurgico è generalmente assillato da paure e dubbi, che molto più che per altre categorie di pazienti, fanno procrastinare l'intervento stesso. Spesso queste paure sono giustificate, ma a volte sono prive di ogni fondamento scientifico.

Dott. Franco Popazzi – Anestesista

28 settembre

Farmaci: istruzioni per l'uso

L'assunzione di un farmaco non è cosa da prendere alla leggera. Prima di assumere farmaci è bene porsi alcune domande, assumerli solo quando servono, non interrompere o prolungare una cura di propria iniziativa. E' comunque sempre necessaria l'indicazione del medico. Per un uso sicuro dei farmaci è necessario seguire alcune regole precise.

Dott. Claudio Albiero – Geriatra

29 ottobre

La convenzione dell'ONU per i diritti dei disabili

Con la Legge 3 marzo 2009 il Parlamento Italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Scopo della Convenzione, che si compone di un Preambolo e di 50 articoli, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. (estratto da: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Giampiero Licinio – Presidente Associazione Tetra-Paraplegici FVG

16 novembre

Malattia di Parkinson: i sintomi, la cura, il volontariato

La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa, cronica e progressiva, che determina deficit di alcune funzioni come il controllo motorio e l'equilibrio. La malattia è presente in entrambi i sessi, l'età media di esordio è intorno ai 60 anni, ma in alcuni casi può presentarsi in età giovanile. Non esiste una terapia che guarisca dalla malattia ma i farmaci e le terapie alternative (neurochirurgia, dispositivi a infusione) oggi a disposizione possono ridurre notevolmente i sintomi e consentire quindi una buona qualità di vita. Il volontariato fornisce ai malati di Parkinson e ai loro familiari un sostegno attivo creando occasioni di incontro attraverso attività finalizzate al benessere dei malati.

Dottoressa Alessandra Martinelli – Neurologo presso Ospedale “Gervasutta” Udine –
Presidente Associazione La Farfalla ONLUS Isontina